



Educación para el paciente y familia sobre... Clostridium difficile

Que es Clostridium Difficile?

Muy seguido C. Diff ocurre después de tratamiento con antibióticos. Los antibióticos pueden cambiar la bacteria normal en los intestinos permitiendo que C. Diff crezca. Cuando esto pasa, la persona experimenta retorsiones estomacales, fiebre y diarrea.

Quien contrae C. Diff?

Estos factores de riesgo pueden incrementar su riesgo a contraer C. Diff: Antibióticos, o quimioterapia.

Como es tratado?

C. Diff es usualmente tratado con Flagyl o Vancomicina oral. La persona será tratada por esto solo si tiene síntomas. Una persona puede tener esta bacteria sin tener síntomas. Si este es el caso la persona no es usualmente tratada con medicamentos.

Como se contagia?

Se puede contagiar de persona a persona a través de contacto con la persona que tenga C. Diff o su ambiente. El paciente en nuestro hospital será puesto bajo aislamiento de contacto. Nuestro personal usara batas desechables y guantes en el cuarto. C. Diff es encontrado en el excremento. Es importante que la persona con C. Diff se lave bien las manos, y practique buena higiene personal especialmente después de ir al baño y antes de tocar comida.

Mis visitas están en riesgo de contraer esta infección?

Las visitas también deberán de lavarse las manos; el uso de batas desechables y guantes es opcional para las visitas, pero aconséjele los riesgos que tiene de contraer C Diff. (Vea arriba). Si su visita esta enferma, o tiene un sistema inmunológico bajo, entonces ellos probablemente deberán de retrasar su visita hasta que usted este mejor.